

ADVANTIX 4 pipettes

Elimine les puces, tiques et poux broyeurs.



Prix : 28.95€

Options disponibles :

Taille du chien : Petit 4/10 Kg, Moyen 10/25 Kg (+ 4.00€), Grand 25/40 Kg (+ 11.00€)

Descriptif :

Antiparasitaire externe qui propose une triple protection contre les tiques, les puces, les moustiques et les phlébotomes.

Grâce à l'action synergique de deux principes actifs, il permet :

- Une action préventive et curative contre les puces,
- Une efficacité acaricide et répulsive contre les tiques,
- Une activité répulsive contre les phlébotomes et les moustiques.

Advantix reste efficace même après les bains et les shampoings. Il est tout de même préférable de limiter les expositions à l'eau car la rémanence du produit peut diminuer.

Indications :

- Prévention et traitement des infestations par les puces (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*). Les puces présentes sur le chien sont tuées en 24 heures qui suivent le traitement. Un seul traitement prévient les ré-infestations par les puces pendant 4 semaines. Le médicament peut être intégré dans un programme

thérapeutique de la Dermatite Allergique par Piqûres de Puces (DAPP).

- Traitement des infestations par les poux broyeurs (*Trichodectes canis*). Le produit possède une efficacité acaricide et répulsive persistant pendant 4 semaines (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*) et 3 semaines (*Dermacentor reticulatus*). Les tiques déjà présentes sur le chien au moment du traitement peuvent ne pas être tuées pendant les 2 jours suivant l'administration du traitement et peuvent rester fixées et visibles. Aussi il est recommandé d'enlever les tiques présentes lors de l'application du traitement, afin d'éviter leur attachement et la prise de repas sanguin.

Un seul traitement assure une activité répulsive (anti-gorgement) contre les phlébotomes pendant 2 semaines (*Phlebotomus papatasi*) à 3 semaines (*Phlebotomus perniciosus*), contre les moustiques pendant 2 semaines (*Aedes aegypti*) à 4 semaines (*Culex pipiens*) et contre les mouches d'étable (*Stomoxys calcitrans*) pendant 4 semaines.

Posologie :

- Chiens de 4 jusqu'à 10 kg : une pipette de ADVANTIX Petit chien (1,0 ml).
- Chiens de 10 jusqu'à 25 kg : une pipette de ADVANTIX Chien Moyen (2,5 ml).
- Chiens de 25 jusqu'à 40 kg : une pipette de ADVANTIX Grand chien (4,0 ml).

Mode d'administration :

Pour les chiens de moins de 10 kg : appliquer le contenu de la pipette directement sur la peau entre les omoplates de l'animal. Ecartez les poils du chien jusqu'à ce que la peau soit bien visible. Placer l'extrémité de la pipette Advantix sur la peau et presser délicatement pour déposer la solution sur la peau. Veillez à ne pas déposer trop de solution pour que le produit ne coule pas sur les flancs du chien.

Appliquer uniquement sur une peau saine.

Le traitement reste efficace si l'animal est mouillé. Cependant, éviter une exposition intense et prolongée à l'eau. Lors d'exposition répétée à l'eau, la durée d'efficacité peut être réduite. Dans ce cas, un intervalle d'une semaine doit être respecté entre deux applications. Au cas où il serait nécessaire de laver le chien avec un shampoing, il est recommandé de le faire avant application du médicament ou au moins deux semaines après, pour assurer une efficacité satisfaisante du médicament.

En cas d'infestation par les poux broyeurs, il est recommandé d'effectuer un nouvel examen clinique 30 jours après le traitement car une deuxième application peut être nécessaire pour certains animaux.

Ne pas utiliser :

- Sur les chiots âgés de moins de 7 semaines et pesant moins de 1,5 kg
- en cas d'hypersensibilité connue aux principes actifs
- sur les chats

Effets indésirables :

En de rares occasions, certains chiens traités pourront présenter une sensibilité cutanée passagère (prurit accru, alopecie, érythème au site d'application). Dans de très rares cas, certains chiens peuvent montrer des changements de comportement (agitation, nervosité, gémissement ou roulement sur le sol), des symptômes gastro-intestinaux (vomissement, diarrhée, hypersalivation, diminution d'appétit) et des signes neurologiques tels que des mouvements instables et des contractions musculaires en cas de sensibilité à la perméthrine. Ces signes sont transitoires et se résolvent spontanément. Une intoxication après ingestion accidentelle chez le chien est improbable, mais peut survenir dans de rares cas. Lors d'un tel événement, des signes neurologiques tels que des tremblements et une léthargie peuvent survenir. Un traitement symptomatique doit être instauré par un vétérinaire. Il n'y a pas d'antidote spécifique connu.

Précautions particulières d'emploi :

Chez les animaux : Éviter le contact de la solution avec les yeux ou la bouche des chiens traités. Veiller à administrer le produit correctement tel que décrit dans la rubrique « Posologie et voie d'administration ». Veiller notamment à empêcher toute ingestion du produit par léchage du site d'application par les animaux traités ou des animaux en contact avec ces derniers. Ne pas utiliser chez les chats.

Pour l'utilisateur : Bien se laver les mains après l'application. Eviter tout contact du produit avec la peau, les yeux et la bouche. En cas de contact accidentel avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer abondamment à l'eau. Si une irritation de la peau ou des yeux persiste ou en cas d'ingestion accidentelle du produit, consulter un médecin et lui montrer la notice. Ne pas laisser les enfants jouer avec les animaux traités jusqu'à ce que le site d'application soit sec.

Lire attentivement la notice avant utilisation.

[Lien vers la fiche du produit](#)